

ANGIO TK oraz każde badanie TK z kontrastem

Termin badania	
godz. zgłoszenia	

(ze względu na specyfikę badania, godzina może ulec opóźnieniu)

1. Informacje o badaniu:

AngioCT to badanie, które, pozwoli dokonać diagnostyki naczyń tętniczych, po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Badanie wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie.

2. Badanie można wykonać w ramach umowy z NFZ oraz odpłatnie.

W przypadku badań finansowanych przez NFZ- wymagane skierowanie z Poradni Specjalistycznej.

Pacjenci rejestrowani w ramach umowy z NFZ zgłaszają się na ustaloną godzinę do Pracowni Tomografii Komputerowej (II winda, poziom -1).

W przypadku badań odpłatnych – wymagane jest zlecenie lub skierowanie od Lekarza Kierującego na badanie (jest to wymóg zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Atomowego).

Pacjenci zarejestrowani na badanie odpłatne zgłaszają się do Recepcji SGL (III winda, 1 piętro) w celu uzupełnienia danych i dokonania płatności.

3. Przygotowanie do badania:

a) należy dostarczyć **prawidłowy**, aktualny wynik badania laboratoryjnego oznaczenia poziomu **kreatyniny (lub z -eGFR)** oraz u osób z nadczynnością tarczycy wynik oznaczenia poziomu **TSH** (wszystkie wyniki są ważne 2 tygodnie). Wyniki należy dostarczyć w wersji papierowej.

b) Pacjenci z cukrzycą leczeni preparatami **Metforminy** (METFORMAX, SIOFOR, GLUCOPHAGE, FORMETIC, METRAL, METIFOR, GLUFORMIN) powinni:

- Pacjenci z eGFR >30 ml/min/1,73 m² powinni kontynuować normalne przyjmowanie metforminy.

- Pacjenci (a) z eGFR <30 ml/min/1,73 m² powinni zaprzestać przyjmowania metforminy od momentu podania środka kontrastowego i należy wznowić jej przyjmowanie w ciągu 48 godzin, po jego podaniu, jeżeli czynność nerek nie uległa pogorszeniu. **(wytyczne ESUR; wersja 10.0)**

c) Stosowanie leków przeciwkrzepliwych (Sintrom, Syncumar, Acenocumarol) oraz zastrzyków Heparyny podskórnej – proszę uzgodnić z lekarzem.

d) Pozostałe leki można stosować bez zmian.

e) Dzień przed badaniem należy wypić dotatkowo ok. 2 litry niegazowanych płynów (Pacjenci **dializowani** - do decyzji nefrologa).

f) W dniu badania proszę zgłosić się **na czczo** - nie spożywać żadnych posiłków. Pić można.

Przed badaniem należy zgłosić personelowi choroby alergiczne, uczulenia na kontrast.

4. Kobiety miesiączkujące są zobowiązane do poinformowania personelu Pracowni o ciąży!

Terminowe badanie TK u kobiet miesiączkujących wskazane jest, aby było wykonywane w 1-10 dniu cyklu (dla uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej, jeszcze nie rozpoznanej ciąży). Ciąża jest przeciwwskazaniem do badania TK.

5. Wskazane jest posiadanie dokumentacji medycznej wcześniej wykonanych badań i zabiegów (opisy badań RTG, TK, MR, USG, płyty CD) i dotychczasowego leczenia (karty informacyjne) oraz listę aktualnie zażywanych leków.

6. Aby wykonać odpowiedniej jakości badania, pacjent winien stosować się do poleceń osób je wykonujących. Badanie Tomografii Komputerowej wykonuje zespół, w skład którego wchodzi: elektroradiolog, pielęgniarka oraz lekarz specjalista-radiolog.

W trakcie badania należy zgłaszać personelowi jakiegokolwiek objawy niepożądane po podaniu dożylnego środka kontrastowego (duszność, zawroty głowy, nudności, świąd skóry, bóle w klatce piersiowej).

U niektórych pacjentów w trakcie badania lekarz radiolog może zdecydować o poszerzeniu zakresu badania w stosunku do określonego na skierowaniu lub o konieczności dożylnego podania środka kontrastującego pomimo planowanego badania bez takiego środka.

Pacjenci ze słabą kontrolą nad czynnością pęcherza moczowego lub jelit (np. nieotrzymanie moczu, nagłe parcie na pęcherz lub słaba kontrola jelit) winni posiadać czysty pampers.

W razie wystąpienia podczas badania objawów niepożądanych, może ono być w każdej chwili przerwane, w celu oceny tych objawów i wdrożenia właściwego postępowania medycznego. W rzadkich przypadkach badanie może być przerwane z przyczyn technicznych np. z powodu awarii aparatu.

7. Po badaniu, w celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu wskazane jest zwiększone wypicie około 2,5 litra wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych w ciągu następnych 24 godzin.

W rzadkich przypadkach po badaniu z podaniem środka kontrastowego mogą pojawić się nudności, wysypka czy swędzenie. Wskazane jest jak najszybsze zgłoszenie tych objawów lekarzowi.

Pacjent pozostaje pod obserwacją przez 30 min.

9. Odbiór wyników:

Czas oczekiwania na wynik badania wynosi do 21 dni.

O gotowości wyniku do odbioru pacjenci są informowani poprzez wiadomość SMS na numer wskazany przy rejestracji.

Wynik można odebrać osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia w Recepcji Głównej Szpitala (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach **7.00-15.00** (w czwartki do 18.00)

Po wykonaniu badania istnieje możliwość otrzymania płyty CD, jednak jej przygotowanie wymaga czasu związanego z rekonstrukcją i zapisem obrazów. Jeżeli zależy Państwu na odbiorze płyty tego samego dnia, może być konieczne oczekiwanie na jej przygotowania nawet do godziny. Alternatywnie płytę można odebrać w późniejszym terminie lub razem z opisem badania.

Sposób przygotowania do badania dostępny na stronie: <https://bcmbonifratrzy.pl/placowki/krakow>

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO

1. Otrzymałem/am niniejszą pisemną informację na temat sposobu wykonania oraz mogących wystąpić **powikłań** w związku z badaniem **tomografii komputerowej**, w tym **podaniem środka kontrastowego**: Optiray, Ultravist, Omnipaque, Iomeron

2. Ogólne informacje

Stosowanie jodowych środków kontrastowych może wywołać działanie niepożądane, zwykle o charakterze przejściowym i stopniu ciężkości od łagodnego do umiarkowanego. Zanotowano również przypadki ciężkich i zagrażających życiu reakcji prowadzących do zgonu. Reakcje pojawiają się najczęściej w ciągu kilku minut od podania, ale mogą wystąpić znacznie później.

- a) **Ból i obrzęk w miejscu podania**, w większości przypadków są konsekwencją wynaczynienia środka kontrastowego. Reakcje te zwykle są przejściowe i nie powodują trwałego uszczerbku na zdrowiu. Niemniej bardzo rzadko po podaniu tej grupy środków kontrastowych notowano stan zapalny, a nawet martwicę skóry.
- b) **Anafilaksja (ciężka reakcja alergiczna)** przejawia się w różny sposób, bardzo rzadko u jednego pacjenta daje wszystkie możliwe objawy. Zwykle w ciągu 1 do 15 minut (rzadko dłużej niż po 2 godzinach). Może wystąpić złe samopoczucie, pobudzenie, uderzenie gorąca, uczucie ciepła, zwiększona potliwość, zawroty głowy, zwiększone łzawienie, zapalenie śluzówki nosa, kołatanie serca, parestezje (zmienione wrażenia czuciowe), świąd, uczucie pulsowania w głowie, ból gardła i uczucie ściskania w gardle, utrudnione połykanie, kaszel, kichanie, pokrzywka, rumień, łagodne miejscowe obrzęki, obrzęk naczynioruchowy, duszność spowodowaną obrzękiem języka i krtani i/lub jej skurczem.
- c) **Nudności, wymioty, ból brzucha i biegunka**
- d) **Pierwotna zapaść krążeniowa**, występować może jako jedyna i/lub początkowa reakcja bez dodatkowych objawów ze strony układu oddechowego lub bez innych objawów wymienionych uprzednio.
- e) **Skurcz naczyń** prowadzący do niedokrwienia.
- f) **Ciężkie reakcje ze strony układu sercowo- naczyniowego**, takie jak: **rozszerzenie naczyń ze spadkiem ciśnienia tętniczego, przyspieszoną czynnością serca (częstoskurczem), dusznością, pobudzeniem, sinicą, utratą przytomności postępującą do zatrzymania pracy serca i czynności oddechowej**, mogą prowadzić do zgonu. Reakcje te mogą pojawić się szybko i wymagać pełnej i intensywnej reanimacji.

za co wykonujący badanie nie ponosi odpowiedzialności.

3) Oświadczam, że w dniu wydawania skierowania, lekarz kierujący wręczył mi „Informację dla Pacjenta o powikłaniach mogących wystąpić w związku z badaniem tomografii komputerowej w tym z podaniem środka kontrastowego” i dodatkowo przeprowadził ze mną rozmowę, podczas której poinformował mnie wyczerpująco o zleconym badaniu diagnostycznym – sposobie jego wykonania oraz ryzyku powikłań. Udzieliłem/łam lekarzowi informacji dotyczących mojego stanu zdrowia. Mam świadomość, że promieniowanie RTG może mieć niekorzystny wpływ na organizm ludzki, za co wykonujący badanie nie ponosi odpowiedzialności.

.....
Podpis pacjenta

W celu rezygnacji lub zmiany terminu prosimy o informację na numer:

12/37 97 390 - badania płatne 12/37 97 377 - badania na NFZ

e-mail: informacja_krakow@bcmbonifratrzy.pl